

Observatorio al Acceso Universal

a la prevención, atención y
tratamiento del VIH/sida e ITS
para gays, bisexuales, trans y
otros hombres que tienen sexo
con hombres (GBTH) en América
Latina y el Caribe Hispano



Sobre ASICAL

- ASICAL, la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía de América Latina y el Caribe es una de las Redes Latinoamericanas con trabajo en VIH y sida.
- Fue fundada en Lima, Perú, en 1997.
- Trabaja para la respuesta frente al VIH para la comunidad Gay, Bisexual y de otros hombres que hacen sexo con hombres.

Acceso Universal

- Objetivos del Milenio
- Declaración de Compromisos UNGASS
- Impulsaron el *Acceso Universal a la prevención, atención, tratamiento y apoyo del VIH/SIDA e ITS*

Informes “UNGASS”

- Cada dos años, los países deben presentar un informe de la situación del Acceso Universal en sus países.

Informes UNGASS

- En estos informes, se pide a los países que informen sobre la situación de los HSH
- Estos son 5

Indicadores GTBH

- Porcentaje de HSH infectados por el VIH
- Porcentaje HSH que se sometió a prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados
- Porcentaje de HSH que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del virus

Indicadores GTBH

- Porcentaje de hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina
- Porcentaje de HSH al que llegan los programas de prevención de VIH

Objetivo del Observatorio

- Fortalecer los procesos de incidencia política en espacios locales, nacionales y regionales, a través de la gestión de la información basada en el seguimiento a los indicadores sobre Acceso Universal y la producción de información de análisis sobre la situación del VIH/SIDA en ésta población de la región LAC.

Mediante...

- Evaluar y monitorear los alcances y desarrollos de las propuestas que los Estados miembros hicieron para el cumplimiento de las metas de UNGASS.

Para...

- Generar recomendaciones o análisis desde el enfoque GBH

Nuestros Productos

- Informe Consolidado
- Tabla de Indicadores
- Página Web asical.org/observatorio



Asociación para la Salud Integral
y Ciudadanía de América Latina y el Caribe

Observatorio al acceso universal

a la prevención, atención y tratamiento del
VIH/sida e ITS para gays, bisexuales, trans y
otros hombres que tienen sexo con hombres
(GBTH) en América Latina y el Caribe Hispano



4° Informe Consolidado
Año 2009

Informes por país de los indicadores de UNGASS en HSH en América Latina y el Caribe Hispano

Países	Indicadores					Observaciones
	Porcentaje de HSH infectados por el VIH	Porcentaje HSH que se sometió a prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	Porcentaje de HSH que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del virus	Porcentaje de hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina	Porcentaje de HSH al que llegan los programas de prevención de VIH	
Argentina	9%* (gays) 35%* (trans)			90,50%		* Solo del Área Metropolitana de Buenos Aires * De 12 provincias
Bolivia	3600 casos *	81%*		69,3%*	2,60%	* No se ofrecen cifras relativas * El dato corresponde a poblaciones más expuestas sin especificar cuántos son HSH. * Es un dato de 2005
Brasil	0,56%* 7,4%*	62%*	67%*	43%*		* Dato de 2002 * Dato de 2004, asciende al 71% si la última pareja fue ocasional * Dato de 2004 * Dato de 2005 * En Campinas (2006)
Chile		36,91%	55%* 100%*	29%*		* Para la afirmación "Usando condón siempre y durante toda la relación sexual" * Para la afirmación "Compartiendo comida PVVS" * Dato obtenido por MUMS
Colombia	10,8%	61,5%	80,3%			Todos los datos son de hombres entre 17 y 60 años
Costa Rica	44,3% (HSH) 15,5% (bisexuales)*				26%*	* Porcentaje respecto del total de la epidemia, no respecto de la población HSH * Dato de 2006-2007, n=400
Cuba	86%*					* Del total de casos masculinos reportados, no respecto de población HSH
Ecuador	19,2%*	49,9%*	49,9%*		49,9% - 48,7*	* N=1450, habla de poblaciones más expuestas sin especificar cuánto corresponde a HSH * N=1131
El Salvador	17,75%*	40,5%*		83,14%	80%*	* 5 veces mayor que las ITS * Estudio multicéntrico del 2003, mejora del 15% en el 2007 * Porcentaje de HSH que afirmó poder conseguir un condón en el momento que lo necesitaba
Guatemala	11.5%* 18.3%*	63.38%*		80.7%* 73.7%*	72.67%* 79.01%*	* Menores de 25 años * De 25 años y más

Países	Indicadores					Observaciones
	Porcentaje de HSH infectados por el VIH	Porcentaje HSH que se sometió a prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	Porcentaje de HSH que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del virus	Porcentaje de hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina	Porcentaje de HSH al que llegan los programas de prevención de VIH	
Argentina	9%* (gays) 35%* (trans)			90,50%		* Solo del Área Metropolitana de Buenos Aires * De 12 provincias
Bolivia	3600 casos *	81%*		69,3%*	2,60%	* No se ofrecen cifras relativas * El dato corresponde a poblaciones más expuestas sin especificar cuantos son HSH. * Es un dato de 2005
Brasil	0,56%* 7,4%*	62%*	67%*	43%*		* Dato de 2002 * Dato de 2004, asciende al 71% si la última pareja fue ocasional. * Dato de 2004 * Dato de 2005 * En Campinas (2006)
Chile		36,91%	55%* 100%*	29%*		* Para la afirmación "Usando condón siempre y durante toda la relación sexual" * Para la afirmación "Compartiendo comida PVVS" * Dato obtenido por MUMS
Colombia	10.8%	61.5%	80,3%			Todos los datos son de hombres entre 17 y 60 años
Costa Rica	44.3% (HSH) 15,5% (bisexuales)*				26%*	* Porcentaje respecto del total de la epidemia, no respecto de la población HSH * Dato de 2004-2007, n=400
Cuba	86%*					* Del total de casos masculinos reportados, no respecto de población HSH
Ecuador	19,2%*	49,9%*	49,9%*		49,9% - 48,7*	* N=1450, habla de poblaciones más expuestas sin especificar cuanto corresponde a HSH * N=1131
El Salvador	17,75%*	40,5%*		83.14%	80%*	* 5 veces mayor que las TS * Estudio multicéntrico del 2003, mejora del 15% en el 2007 * Porcentaje de HSH que afirmó poder conseguir un condón en el momento que lo necesitaba
Guatemala	11.5%* 18.3%*	63.38%* 65.84%* 48.38%*		80.7%* 73.7%*	72.67%* 79.01%*	* Menores de 25 años * De 25 años y más * Estudio multicéntrico (2003) * Línea de base del Fondo Mundial 2005-2006 * N=248 HSH del Depto. De Escuintla (2007)
Honduras	6%* 10.1%* 5%*	57%*	97.0%*	*	24%	* Identifica que el porcentaje de uso del condón en HSH es bajo especialmente con parejas ocasionales, en relaciones sexuales comerciales, e incluso en relaciones bisexuales pero sin datos. * Identificar correctamente 3 formas de prevención (2003) * 2006 * Tegucigalpa, 2006 * San Pedro Sula, 2006 * La Ceiba

México	9.9%* 6.9%* 12.8%*	53,6%* 43.6%* 62.9%*	65.5%** 62.5%* 68.4%*	79.4%* 79.5%* 79.3%*	18,2%** 16.3%* 19.9%*	* N=1111 (2005/2006) * Menor de 25 años * 25 o más * Responde correctamente a 4 preguntas (de las 5 originales) * N=710, en los últimos 6 meses (2005/2006). Se proveen indicadores adicionales según quien responde: pagó por esa relación sexual, le pagaron o lo hizo con pareja estable (ver datos detallados en Informe) * Responde correctamente a las preguntas: ¿Sabe a donde dirigirse si desea someterse a la prueba de VIH? y ¿Se le han suministrado preservativos en los últimos 12 meses? (Ver datos detallados en Informe)
Nicaragua					5.4%*	* Porcentaje de VSV del total de la población beneficiaria de CEPRESI (n total=24, 297, VSV=13,119)
Panamá	10.6%*	76%*	79%** 71%**	86%*	82%	* R&SMO (2006 y 2007) * Porcentaje que señala que puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH teniendo solamente relaciones sexuales con una pareja no infectada que no tenga otra pareja * Porcentaje que refiere que puede reducir el riesgo de contraer el VIH utilizando un preservativo cada vez que se tienen relaciones sexuales * Datos de EMESSAR y Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP)
Paraguay						No hay datos disponibles acerca de la epidemia en HSH
Perú	10.8%* 14.29%** 30.27%**	57.5%* 20.6%*	40,21% (global) 32,82% (< 25) 46,92% (> 25)	47.19%** 45.54%** 41.5%** 52.8%**	65,5%* 44,5%*	* (2007) Sesgo metodológico presente en el último estudio censinela sugiere que la prevalencia es mayor * 2006 * 2007 * Mayores de 25 años * Menores de 25 años
Republica Dominicana	11%*			86%*		* N=597, 2004, proyecto DELTA, USAID/CONECTA * Porcentaje que declaró haber usado preservativo con su último cliente
Uruguay	27,5%** 16.6%**					* Del total de casos de VIH registrados * HSH * Hombres bisexuales
Venezuela	70%*					* Porcentaje de HSH del total de casos de VIH notificados

Conclusiones del Observatorio

- La población HSH continúa siendo una de las más expuestas y afectadas por la epidemia de VIH. Las epidemias latinoamericanas de VIH continúan siendo concentradas en casi todos nuestros países y la población GBH continúa siendo uno de los grupos de más alta exposición y concentración del VIH.

Conclusiones del Observatorio

- Pero al mismo tiempo, no hay suficientes datos disponibles acerca de la llegada y el impacto de los programas de prevención de VIH en población HSH ni cómo estos han influido en los conocimientos, la información y las prácticas y conductas de cuidado de esta población.
- (en realidad los reportes de UNGASS no evidencian la existencia de programas de prevención para gay y HSH)

Conclusiones del Observatorio

- Por otro lado, una parte importante de los datos que se proveen no son representativos de la población GBH o no son totalmente confiables.
- Muchos de estos datos son demasiado antiguos y poco actualizados, o representan solo a las áreas metropolitanas o a algunas áreas geográficas limitadas y no a la realidad de la epidemia a nivel nacional. (no existe vigilancia epidemiológica en los países a pesar de que los estudios indican la concentración e la epidemia en estas subpoblaciones de hombres)
- La gran amplitud y diversidad de las cifras presentadas para algunos indicadores (por ejemplo, el relativo a uso del condón) hace sospechar que en los países se han utilizado metodologías muy diversas para la obtención de esos datos, o que ha habido sesgos en la recolección o errores vinculados al muestreo. (debido a que no se han hecho estimaciones sobre la población GBH lo que dificulta contar con denominadores que permitan extrapolar los datos de los estudios realizados)

Próximos pasos

- Establecer más corresponsales
- Producción de informes sombra donde sea necesario.
- Producir informes que ayuden a las OSC para incidir en la redacción de los informes de UNGASS.

¡Muchas Gracias!

Pablo Britez

Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina
ASICAL

pablo@sigla.org.ar

